

ARMORACIA RUSTICANA ÓSIMLIGINIŇ BIOLOGIYASI HÁM DÁRILIK QÁSIYETI

¹**R.X. Esemuratova b.f.f.d. (PhD), doc,**

¹Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis q.

²**I. B. Tolegenova,** ²4-kurs talaba

Armoracia rusticana Brassicaceae tuqımlasına tiyisli kóp jıllıq ósimlik bolıp, tiykarınan onıń tamırı azıq-awqat hám dárilik maqsetlerde paydalanıladı ham jergilikli atamasi xren. Armoracia rusticana áyyemnen kóplegen mámleketlerde, ásirese Shigis hám Oraylıq Evropada keń tarqalğan. Bul ósimlik óziniń kúshli ashshı dám hám jađımlı iyisine iye bolıp, tek ğana awqatlarga lázzet beriwde emes, al densawlıqtı bekkemlewde de áhmiyetli orın iyeleydi.

Bólim: Magnoliophyta - Gúlli ósimlikler.

Klass: Magnoliopsida - Eki tuqim úlesliler.

Tártip: Brassicales - Kapustalaslar tártibi.

Tuqimlas: Brassicaceae - Kapustagúlliler.

Tuwis: Armoraciya

Túr: Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Sherb.

Sunday-aq, Armoracia lapathifolia yamasa Cochlearia armoracia sıyaqlı sinonim atamalar ilimiy ádebiyatlarda ushırasadı, biraq zamanagóy botanika nomenklaturası boyınsha atama - Armoracia rusticana.

Xren adamzatqa áyyemnen belgili bolgan ósimliklerden biri. Ol biziń eramızǵa shekemgi 1-mıń jıllıqta Shıǵıs Evropa hám Qara teńiz boyı aymaqlarında jetistirilgen. Grekler hám rimliler bul ósimlikti tek ğana azıq-awqatta emes, al emlew quralı sıpatında da keńnen qollanğan. Grekshe atı "armorakia" sózinen kelip shiqqan bolıp, "tikenli japıraqlı ósimlik" degen mánisti bildiredi.

Rimlilar dáwirinde xren jıllı hám ıgallı jerlerde, atap aytqanda, Balkan yarım atawında, Dnepr hám Dunay dáryaları basseynlerinde jetistirilgen. Keyin ala ol oraylıq hám arqa Evropaga keń tarqaldı. 16-17-ásirlerde xren Germaniya, Polsha, Avstriya, Rossiya hám Skandinaviya mámleketlerinde xalıq medicinasında áhmiyetli orın iyeledi.

Xren ósimligi kóp jıllıq bolıp, onıń tamır qalıń, uzın hám tereń jer astına kiredi. Ósimliktiń biyikligi ádette 60 tan 150 santimetrge shekem boladı. Japıraqları iri, tesilgen formada, qattı hám tikenli qırlarğa iye bolıp, kóbinese toq jasıl reńde boladı. Xren suwıqqa shıdamlı bolıp, erte báhárde yamasa gúzde egiledi. Ol ıgal hám ortasha ıgallıqtağı, jaqsı drenajlangan topıraqlarda jaqsı ósedı. Kóbeytiw ushın tamır bólekleri yamasa tuqımnan paydalanıladı. Ádette, tamır bólekleri járdeminde kóbeytiw ańsat hám tez ámelge asadı.

Jerburishi, xren (Armoracia) - kapustagúlliler tuqımlasına tiyisli kóp jıllıq ósimlik túri, palız egin. Evraziyada 2 túri bar. Ápiwayı burish (A. rusticana) - Evropa, Hindstan, AQSH, Qıtay, Orta Aziyada egiledi (tamırında C vitamini, efır mayları, fitonsidler bar). Awqatlanıw ushın juwan etli tamırshası (zirawar retinde) hám japırağı paydalanıladı. Túbi japıraqlı. Japırağı jasıl, sopaq, shoq-shoq bolıp ósedı. Tamiri topıraqqa 80-100 sm ge shekem kirip baradı, tamır paqalı bolsa topıraqtıń 30 sm ge shekem bolgan bóleginde jaylasadı. Xren joqarı temperaturağa shıdamlı, ıgallıqqa talapshań. Tamir paqallarınan tayarlangan qálemshelerden (uz. 15-20 sm, qalınlıǵı 1-1,5 sm) kóbeytileđi. Gúzde qálemsheler jer tólede yamasa teplicalarda saqlanadı. Erte báhárde yamasa avgust ayında atızlarga qatarlap yamasa qos qatarlap egiledi. 1 ga maydanga 40-55 min nál ketedi. Gúzde ósiw

dáwiri tamam bolgannan keyin, tamır miyweleri qazıp alınadı. 120-150 c/ga tamır pán hám 350-400 c/ga japıraq alınadı.

Xren ózine tán ótkir iyis hám jaǵımlı dám beredi. Azıq-awqat sanaatında, túrli ónimlerdi (pomidor, qıyar hám b.) duzlawda qollanıladı. Valkovskiı, Atlant, Suzdal sortları egiledi. Ózbekistanda jeke qıytaq jerlerde, fermer xojalıqlarında jetistiriledi. Lug E. (*A. sisymbrioides*) - jabayı halda ushirasadı. Tamırpaqalı azıqlıq esaplanadı.

Xren tamırında sinigrin (glyukozinolatlar toparına kırıwshi birikpe) bar bolıp, ol qıshqıl tám hám iyisti beredi. Bunnan tısqarı, tamırda efir mayları, vitamin C, kaliy hám basqa minerallar kóp boladı. Bul dárilik zatlar xrenniń antibakterial, antifungal hám antioksidant qásiyetlerin belgileydi. Sonlıqtan ol tek ǵana priprava sıpatında emes, al dárilik zat retinde de qádirlenedi. Xrenniń ótkir dámi sebepli ol dem alıw jolların tazalawda, jóteldi kemeytiwde hám immunitetti arttırıwda nátiyjeli járdem beredi.

Bul dárilik ónimniń quramında kaliy, kalciy, natriy, fosfor, temir hám basqa da minerallar bar. Sonday-aq, ol V, S vitaminleri, askorbin kislota, fitonsidler, efir mayları, qant, kraxmal, uglevod, kletchatkalarğa baylıǵı menen de ajıralıp turadı. Jańa japıraqları bolsa C, B, PP vitaminler.


Traxeit, bronxit, úzliksiz jótelde qollanılıwı: qırǵızdan ótkerilgen bir qasıq yer qıyardı úsh qasıq pal menen aralastırıp tındırıp, kúnine 1 márte 1 shay qasıqtan ishiledi.

Cistit hám uretrit keselligine shalıǵan nawqaslar ushın: qırǵıstan ótkerilgen 1 as qasıq yer burishın 100 ml. qaynaǵan suw menen aralastırıp, 5 minut ústini jabıp tındırıp qoyıladı hám kúnine 3-4 márte ishiledi.

Buvin awırıwlarında tómendegi súrtpe usınıs etiledi: jer burış tamırın gósh maydalağıshtan ótkerip, oğan teń muǵdarda maydalağıshtan shıǵarılǵan alma qosıladı. Ol jaqsılap aralastırılıp awırıw ornına málhám sıpatında kompress islenedi.

Xren kóp jıllardan berli azıq-awqat sanaatında dám beriwshi sıpatında qollanıladı. Ol góshli taǵamlar, salatlar hám konservalarǵa mazalı dám qosadı. Sonday-aq, xalıq medicinasında dem aliw jolları keselliklerin emlewde, qanda qan aylanıwın jaqsılawda hám organizmdi mikrobılardan qorgawda qollanıladı. Awıl xojalıǵında xren ósimligi topıraqtı dezinfekciyalawda hám eginler arasında zıyankeslerdiń rawajlanıwın azaytıwda paydalı bolıwı múmkin.

Bul ósimliktiń japıraqları hám gúlleriniń quramında 61 elementtiń muǵdarı anıqlanǵan. Ápiwayı burıshtıń japıraqlarında anıqlanǵan makro hám mikroelementlerdiń muǵdarı gúllerine salıstırǵanda 2,5 esege kóbirek ekenligi anıqlandı. Kalciy, kaliy, magniy, natriy hám fosfor sıyaqlı makroelementlerdiń muǵdarı anıqlanıp, kalciy hám kaliy japıraqlarında makroelementlerdiń 87% in hám gúllerinde 80% in quraytuǵını anıqlandı. Anıqlanǵan mikroelementlerden temir, stronciy, alyuminiy, marganec, bor, cink, bariy, mis, titan, rubidiy, litiy, molibden, nikel, kobalt hám xrom elementleriniń muǵdarı salıstırmalı kóbirek ekenligi kórsetilip, temir japıraqlarında mikroelementlerdiń 70% hám gúllerinde 50% ekenligi anıqlandı.



1 – súwret. Xren - *Armoracia rusticana* ósimligi

Armoracia rusticana tamırı tek ġana azıq-awqat sanaatında emes, al dárilik maqsetlerde de úlken áhmiyetke iye. Xrenniń ekologiyalıq sharayatlarġa beyimlesiwsheńligi hám kóp jıllıq ósimlik sıpatında ekonomikalıq jaqtan paydalı bolıwı onı awıl xojalıġı ushın áhmiyetli resursqa aylandıradı. Sonlıqtan, xrendi úyreniw hám onıń imkaniyatlarınan nátiyjeli paydalanıw áhmiyetli máselelerden biri bolıp tabıladı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR:

1. Sampliner D., Miller A.(2009). Ethnobotany of Horseradish (*Armoracia rusticana*, Brassicaceae) and Its Wild Relatives(*Armoracia* spp.): Reproductive Biology and Local Uses in Their Native Ranges. *Economic Botany*, 63(3), 303-313.



2.Sarli G., De Lisi A., Agneta R., Grieco R. Ierardi G., Montemurro F., Negro D., Montesano V. (2012). Collecting horseradish (*Armoracia rusticana*, Brassicaceae): Local uses and morphological characterization in Basilicata (Southern Italy). Genet Resour Crop Evol, 59(9), 889–899.